

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 37 (มิถุนายน 2562) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้บริจาคเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 10	3353	1	0.03	209	36	17.22	1910	24	1.26	583	52	8.92	588	1	0.17	16	1	6.25
สมุทรสาคร 74																		
สมุทรปราการ 11																		
สมุทรสงคราม 75							205	1	0.49				10	0	0.00	43	0	0.00
นนทบุรี 12	1474	1	0.07				1789	17	0.95							305	2	0.66
ปทุมธานี 13							744	10	1.34							50	0	0.00
นครปฐม 73																		
ราชบุรี 70																		
กาญจนบุรี 71	1064	0	0.00				1108	2	0.18									
เพชรบุรี 76	3171	9	0.28				510	5	0.98									
ประจวบคีรีขันธ์ 77	454	0	0.00				210	4	1.90									
สุพรรณบุรี 72																		
สิงห์บุรี 17	272	2	0.74				332	2	0.60							62	1	1.61
พระนครศรีอยุธยา 14	1287	1	0.08				1130	7	0.62							250	3	1.20
สระบุรี 19																		
ลพบุรี 16	2687	3	0.11				372	4	1.08							36	0	0.00
ชัยนาท 18	272	0	0.00				330	5	1.52									
อ่างทอง 15	230	0	0.00				264	3	1.14									
นครนายก 26							242	1	0.41							31	1	3.2258
ชลบุรี 20																		
ฉะเชิงเทรา 24							664	5	0.75							22	0	0.00
ระยอง 21							639	9	1.41							253	3	1.1858
จันทบุรี* 22	4021	3	0.07				212	4	1.89									
ตราด 23																		
ปราจีนบุรี 25																		
สระแก้ว 27																		
รวมภาคกลาง	14264	17	0.12	209	36	17.22	10449	99	0.95	583	52	8.92	588	1	0.17	1068	11	1.03
Median			0.05			17.22			0.98			8.92			0.17			0.92
Max			0.74			17.22			1.90			8.92			0.17			3.23
Min			0.00			17.22			0.18			8.92			0.17			0.00

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 37 (มิถุนายน 2562) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเสฟติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงใหม่ 57	150	0	0.00				160	0	0.00							55	0	0.00
เชียงใหม่ 50																		
พะเยา 56																		
แม่ฮ่องสอน 58																		
ลำปาง 52							501	2	0.40				73	10	13.70	40	1	2.50
ลำพูน 51							281	0	0.00									
น่าน 55																		
แพร่ 54	1499	3	0.20				634	1	0.16							53	1	1.89
อุตรดิตถ์ 53																		
ตาก 63							81	1	1.23							27	0	0.00
สุโขทัย 64	521	1	0.19				553	9	1.63									
พิษณุโลก 65																		
เพชรบูรณ์ 67	4637	0	0.00				1183	6	0.51	156	20	12.82						
พิจิตร 66	443	0	0.00				561	4	0.71	62	2	3.23				142	2	1.41
อุทัยธานี 61							408	3	0.74							104	7	6.7308
กำแพงเพชร 62	957	0	0.00				594	3	0.51							52	0	0.00
นครสวรรค์ 60	3327	3	0.09				1222	8	0.65	54	8	14.81	40	1	2.50	464	1	0.22
รวมภาคเหนือ	11534	7	0.06	-	-	-	6178	37	0.60	272	30	11.03	113	11	9.73	937	12	1.28
Median			0.00			-			0.51		1	12.82			8.10			0.81
Max			0.20			-			1.63		1	14.81			13.70			6.73
Min			0.00			-			0.00		1	3.23			2.50			0.00

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 37 (มิถุนายน 2562) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเสพติคชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
นครราชสีมา 30							1643	12	0.73									
ขอนแก่น 40	26	1	3.85				669	4	0.60							93	0	0.00
ชัยภูมิ 36	2107	0	0.00				572	0	0.00									
สกลนคร 47	3981	5	0.13				1242	6	0.48									
นครพนม 48							182	0	0.00							156	1	0.64
กาฬสินธุ์ 46																		
หนองคาย 43																		
มหาสารคาม 44																		
ร้อยเอ็ด 45							727	2	0.28									
บุรีรัมย์ 31							1846	11	0.60							80	0	0.00
เลย 42																		
ศรีสะเกษ 33	2407	1	0.04				1060	7	0.66							270	6	2.22
สุรินทร์ 32							1671	4	0.24				16	0	0.00	86	0	0.00
อุดรธานี 41							1965	15	0.76							170	5	2.94
อุบลราชธานี 34							734	3	0.41				69	1	1.45	140	1	0.71
ยโสธร 35	1095	0	0.00				665	1	0.15				7	0	0.00	66	1	1.52
มุกดาหาร 49																		
อำนาจเจริญ 37	460	1	0.22				298	1	0.34							38	0	0.00
บึงกาฬ 38																47	0	0.00
หนองบัวลำภู 39																		
รวมภาคต่อ/น	10076	8	0.08	-	-	-	13274	66	0.50	0	0	0.00	69	1	1.45	1146	14	1.22
Median			0.08			-			0.41			0.00			0.00			0.32
Max			3.85			-			0.76			0.00			1.45			2.94
Min			0.00			-			0.00			0.00			0.00			0.00

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 37 (มิถุนายน 2562) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ กองกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้บริจาคเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86							748	5	0.67				52	1	1.92	165	1	0.61
ระนอง 85																		
สุราษฎร์ธานี 84																148	0	0.00
พังงา 82							46	0	0.00				18	0	0.00	157	1	0.64
ภูเก็ต 83	3001	6	0.20				429	2	0.47									
กระบี่ 81																		
พัทลุง 93																		
นครศรีธรรมราช 80																		
ตรัง 92	3346	2	0.06				1072	0	0.00				28	0	0.00	118	0	0.00
สงขลา 90	4666	4	0.09				1118	0	0.00	107	3	2.80						
สตูล 91	1422	0	0.00				264	0	0.00							258	1	0.39
ปัตตานี 94							4545	1	0.02				183	2	1.09	25	0	0.00
ยะลา 95 *	560	1	0.18	33	0	0.00	860	4	0.47	48	0	0.00	117	1	0.85	102	0	0.00
นราธิวาส 96	1295	4	0.31	6	2	33.33	186	1	0.54									
รวมภาคใต้	13730	16	0.12				8408	9	0.11	107	3	2.80	263	3	1.14	871	3	0.34
median			0.09						0.01			2.80			0.55			0.19
Max			0.31						0.67			2.80			1.92			0.64
Min			0.00						0.00			2.80			0.00			0.00

รวมทั้งประเทศ	49604	48	0.10	209	36	17.22	38309	211	0.55	962	85	8.84	1033	16	1.55	4022	40	0.99
Median			0.06			17.22			0.54			8.92			1.45			0.50
Max			0.74			17.22			1.90			14.81			13.70			6.73
Min			0.00			17.22			0.00			2.80			0.00			0.00

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ฯ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนธันวาคม 2563)